


金適配®

龜神跳仔 金適配

廣譜型殺蟲劑



金適配® Transform®

50%水分散性粒劑

(速殺氣)

殺蟲劑



速效



無交互抗性



有效防治刺吸式害蟲



胃毒與觸殺雙重作用方式



金適配® 龜神跳仔 金適配 廣譜型殺蟲劑



產品使用方法

柑桔類 當粉介殼蟲發生時，連續使用金適配 (7500倍)，必要時隔七天施藥一次，可提供優於市場競爭產品的快速防效，並有效防治柑桔上的刺吸式粉介殼害蟲。具有不傷幼果、對人畜安全、及無臭味等優點，並有獨特作用機制無交互抗性。請與其他不同機制藥劑輪替使用。



粉介殼蟲

適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
柑桔類	粉介殼蟲類	0.1-0.2 公斤	7,500	7	-	14	避免於標的作物開花時期使用

番荔枝 當粉介殼蟲發生時，使用金適配 (5000倍)，隔 10-14 天施藥一次，可提供優於市場競爭產品的防治效果，並具有不傷幼果、對人畜安全、及無臭味等優點。可同時防治其他番荔枝上的刺吸式害蟲。請與其他不同機制藥劑輪替使用。

施用前



施用後14天



適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
番荔枝	粉介殼蟲類	0.15-0.2 公斤	5,000	10	最多 2 次	14	

水稻 當褐飛蝨發生時開始施藥，連續使用金適配 (8000倍)，必要時隔七天施藥一次，可有效防治褐飛蝨。具有速效、低水生毒、及可防治各類飛蝨等優點。請與其他不同機制藥劑輪替使用。

褐飛蝨喜聚集在稻叢基部，施藥時由於稻株生長勢的屏蔽作用，藥液主要集中在植株上部 20cm 以上的葉片正面，到達稻叢基部的藥量很少，可能不足致死劑量，建議將藥液噴施至稻叢基部。



褐飛蝨



褐飛蝨群聚於叢基部



飛蝨嚴重危害水稻(穀地)

適用作物	防除對象	每公頃每次施藥量	稀釋倍數	施藥間隔 / 天	施用次數	安全採收期 / 天	注意事項
水稻	褐飛蝨	0.15 公斤	8,000	7	最多 2 次	21	避免於開花期使用