

准予備查



警告

農藥准字第03207號

適用作物	防除對象	每公頃 每季用量	稀釋 倍數	施藥時間及方法	注意事項
柑桔類	粉介殼蟲類	0.25-0.5 公升	3000	害蟲發生時間開始施藥，必要 時隔7天再施藥一次。	採收前14天停止施藥
番石榴	粉介殼蟲類	0.4-0.7 公升	3000	害蟲發生時間開始施藥，必要 時隔10天再施藥一次，共二次。	採收前7天停止施藥
番荔枝	粉介殼蟲類	0.3-0.7 公升	2200	害蟲發生時間開始施藥，必要 時隔10天再施藥一次，共二次。	採收前14天停止施藥
瓜菜類	粉蝨類	0.25- 0.5公升	2400	害蟲發生時間開始施藥，必要 時隔7天再施藥一次，共二次。	採收前6天停止施藥
十字花科小葉菜類 白菜類及根菜類	粉蝨類	0.1-0.4 公升	2400	害蟲發生時間開始施藥，必要 時隔7天再施藥一次，共二次。	包莖菜類及小葉菜採收 前6天停止施藥；根菜 類採收前7天停止施藥

有效成份：[Methyl(oxo)(1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl)-λ6-sulfanylidene]cyanamide..... 21.8%

其他成份：..... 78.2%

物理性狀：淡褐色糊狀液體

榮民總醫院臨床毒藥物防治諮詢中心緊急連絡電話02-28717121

發生意外時，緊急求助電話：台灣道禮股份有限公司 02-87701101(日)

製造日期：

分裝日期：

批 號：

有效期間：三年

容 量：100 毫升



好到陣® Closer®  
21.8%水懸劑  
(速殺氣)

殺蟲劑

\*台灣化學工業公司(台北)經銷農藥公司的商標

國外生產工廠：Helena Industries

地址：434 Fenn Road, Cordele, Georgia 31015, U.S.A.

進口：台灣道禮股份有限公司

地址：台北市松山區敦化北路167號14樓

電話：02-87701101

分裝工廠：富農化學工業股份有限公司

地址：桃園市觀音區保障里九鄰富源51-10號



農用藥劑

作用機制 4C 殺蟲劑

● 危害警告訊息

對蜜蜂有劇毒。

● 危害防範措施

預防措施：避免排放至環境中；廢棄處置：將內容物/容器送到核可的廢棄物處理廠處置。

● 預防中毒及解毒方法

噴灑本劑，應穿戴防護衣，避免與眼睛、皮膚和衣服接觸，若不慎沾及眼睛，應以肥皂及清水清洗乾淨；若沾到衣物，衣物應充分清洗乾淨才可再使用。若誤食中毒，勿催吐，勿給失去知覺的病人任何東西，立即送醫診治，催吐與否，醫生視臨床狀況給予處置。

● 儲藏及使用時應注意事項

1. 避免於標的作物開花時期使用。2. 應與其他不同作用機制藥劑輪用，以避免發生抗藥性。3. 於通風處操作。4. 儲存於冷涼地方，勿與食物、飼料或飲料置放一起，勿置於小孩可拿到的地方。

● 廢容器處理方法

(一)農藥廢容器清洗方法：農藥空瓶包括塑膠瓶、玻璃瓶、鋁罐等，於農藥用完後空瓶(罐)用清水清洗三次，勿隨意傾倒，以防汙染。(二)農藥廢容器回收方法：1. 使用後廢容器集中存放2. 丟入農藥廢容器回收桶3. 送交農藥廢容器回收站4. 數量集中達10公斤以上者，請撥免費回收電話0800-085-717