

准予備查



警告

農藥進字第03206號

適用作物	防除對象	每公頃每次用量	釋藥倍數	施藥時間及方法	注意事項
柑桔類	粉介殼蟲類	0.1-0.2公斤	7500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次	採收前14天停止施藥
番石榴	粉介殼蟲類	0.2-0.3公斤	7500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天再施藥一次，共二次	採收前7天停止施藥
番荔枝	粉介殼蟲類	0.15-0.2公斤	5000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔10天再施藥一次，共二次	採收前14天停止施藥
瓜菜類	粉介殼蟲類	0.1-0.2公斤	5500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次，共二次	採收前6天停止施藥
茄科小葉菜類 及果菜類	粉介殼蟲類	0.09-0.3公斤	5500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次，共二次	小葉菜類：採收前6天停止施藥；果菜類：採收前7天停止施藥

有效成份：[Methyl(oxo)[1-[6-(trifluoromethyl)-3-pyridyl]ethyl]-λ6-sulfanylidene]cyanamide 50%

其他成份：..... 50%

物理性狀：淡褐色顆粒

榮民總醫院臨床毒藥物防治諮詢中心緊急連絡電話02-28717121

發生意外時，緊急求助電話：台灣道禮股份有限公司 02-87701101(日)

製造日期：

分裝日期：

批 號：

有效期間：三年

重 量：100 克



金適配® Transform®
50%水分散性粒劑
(速殺氣)

殺蟲劑

*TM陶氏化學公司(“陶氏”)或其關聯公司的商標

國外生產工廠：Gowan Milling Company, L.L.C.
地址：12300 East Country 8th Street, Yuma, Arizona 85365, USA

進口：台灣道禮股份有限公司

地址：台北市松山區敦化北路167號14樓

電話：02-87701101

分裝工廠：富農化學工業股份有限公司

地址：桃園市觀音區保障里九鄰草漯51-10號



農用藥劑

作用機制 4C 殺蟲劑

● 危害警告訊息

造成眼睛刺激、對水生生物有害、對蜜蜂有劇毒。

● 危害防範措施

預防措施：避免排放至環境中；事故應變：收集溢漏；廢棄處置：將內容物/容器送到核可的廢棄物處理廠處置

● 預防中毒及解毒方法

噴灑本劑時，應於通風地方操作，穿戴防護衣，避免與眼睛、皮膚和衣服接觸，若不慎沾及眼睛，應以肥皂及清水清洗乾淨；若沾到衣物，衣物應充分清洗乾淨才可使用。若誤食中毒，勿催吐，勿給失去知覺的病人任何東西，立即送醫診治，催吐與否，醫生視臨床狀況給予處置。

● 儲藏及使用時應注意事項

1. 避免於標的作物開花時期使用。2. 應與其他不同作用機制藥劑輪用，以避免發生抗藥性。3. 於通風處操作。4. 儲存於冷涼地方，勿與食物、飼料或飲料置放一起，勿置於小孩可拿到的地方。

● 廢容器處理方法

農藥廢容器清洗及回收方法(一)農藥廢容器清洗方法：農藥空瓶包括塑膠瓶、玻璃瓶、鋁罐等，於農藥用後空瓶(罐)用清水清洗三次，勿隨意傾倒，以防汙染。(二)農藥廢容器回收方法：1. 使用後廢容器集中存放2. 丟入農藥廢容器回收桶3. 送交農藥廢容器回收站4. 數量集中達10公斤以上者，請撥免費回收電話0800-085-717